

# Twierdzenie sinusów

Musimy znać twierdzenie sinusów i umieć je zastosować do obliczania promienia okręgu opisanego na trójkącie, boków trójkąta, kątów trójkąta.

Na następnych slajdach omówione zostaną trzy przykłady zastosowania twierdzenia sinusów.

# Twierdzenie sinusów

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

# Twierdzenie sinusów

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Uwaga:  $\alpha$  to kąt na przeciwko boku  $a$ ,  $\beta$  to kąt na przeciwko boku  $b$ ,  $\gamma$  to kąt na przeciwko boku  $c$ ,  $R$  to promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

# Oznaczenia

Standardowo w trójkącie  $ABC$ , bok na przeciwko wierzchołka  $A$  (czyli bok  $BC$ ) oznaczamy literą  $a$ , a kąt przy tym wierzchołku literą  $\alpha$ . Analogicznie dla wierzchołka  $B$ , będą to  $b$  (bok  $AC$ ) i  $\beta$ . Dla wierzchołka  $C$ :  $c$  (bok  $AB$ ) i  $\gamma$ .

# Pole trójkąta

W książce na stronach 250 - 251 omówiony jest dowód twierdzenia sinusów.

## Pole trójkąta

W książce na stronach 250 - 251 omówiony jest dowód twierdzenia sinusów. Przyjrzymy się innemu dowodowi pierwszej części twierdzenia i przy okazji wyprowadzimy dodatkowy wzór na pole trójkąta.

# Pole trójkąta

W książce na stronach 250 - 251 omówiony jest dowód twierdzenia sinusów. Przyjrzymy się innemu dowodowi pierwszej części twierdzenia i przy okazji wyprowadzimy dodatkowy wzór na pole trójkąta.


Udowodnimy, że

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$



## Pole trójkąta

Rozważmy trójkąt  $ABC$ , jak na rysunku.



$$P_{\triangle ABC} = \frac{a \times h_a}{2} = \frac{b \times h_b}{2} = \frac{c \times h_c}{2}$$

## Pole trójkąta

Wykorzystując funkcje trygonometryczne mamy:

$$h_a = c \times \sin \beta$$

$$h_b = a \times \sin \gamma$$

$$h_c = b \times \sin \alpha$$

Wykorzystując wzór na pole otrzymujemy:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{a \times c \times \sin \beta}{2} = \frac{b \times a \times \sin \gamma}{2} = \frac{c \times b \times \sin \alpha}{2}$$

# Pole trójkąta

Mamy dodatkowy wzór na pole trójkąta:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{a \times c \times \sin \beta}{2} = \frac{b \times a \times \sin \gamma}{2} = \frac{c \times b \times \sin \alpha}{2}$$

# Pole trójkąta

Mamy dodatkowy wzór na pole trójkąta:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{a \times c \times \sin \beta}{2} = \frac{b \times a \times \sin \gamma}{2} = \frac{c \times b \times \sin \alpha}{2}$$

Pole to połowa iloczynu długości dwóch boków i sinusa kąta **pomiędzy** nimi.

# Pole trójkąta

Mnożąc prawą część wzoru, czyli:

$$\frac{a \times c \times \sin \beta}{2} = \frac{b \times a \times \sin \gamma}{2} = \frac{c \times b \times \sin \alpha}{2}$$

przez  $\frac{2}{a \times b \times c}$  otrzymujemy:

# Pole trójkąta

Mnożąc prawą część wzoru, czyli:

$$\frac{a \times c \times \sin \beta}{2} = \frac{b \times a \times \sin \gamma}{2} = \frac{c \times b \times \sin \alpha}{2}$$

przez  $\frac{2}{a \times b \times c}$  otrzymujemy:

$$\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} = \frac{\sin \alpha}{a}$$



Spróbuj samodzielnie przeprowadzić ten dowód, gdy nasz trójkąt  $ABC$  nie jest ostrokątny.

Spróbuj samodzielnie przeprowadzić ten dowód, gdy nasz trójkąt  $ABC$  nie jest ostrokątny.

Będzie wtedy trzeba wykorzystać wzór redukcyjny:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$



## Przykład 1

W trójkącie  $ABC$  mamy dane  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $\angle ACB = 135^\circ$ . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

## Przykład 1

W trójkącie  $ABC$  mamy dane  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $\angle ACB = 135^\circ$ . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Ważna obserwacja: bok  $AB$  leży na przeciwko kąta  $\angle ACB$ .

## Przykład 1

W trójkącie  $ABC$  mamy dane  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $\angle ACB = 135^\circ$ . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Ważna obserwacja: bok  $AB$  leży na przeciwko kąta  $\angle ACB$ .

Wprowadźmy oznaczenia:  $AB = c$ ,  $\angle ACB = \gamma$ .

## Przykład 1

W trójkącie  $ABC$  mamy dane  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $\angle ACB = 135^\circ$ . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Ważna obserwacja: bok  $AB$  leży na przeciwko kąta  $\angle ACB$ .

Wprowadźmy oznaczenia:  $AB = c$ ,  $\angle ACB = \gamma$ . Mamy wtedy:

$$\frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

# Przykład 1

$$c = 3\sqrt{2}$$

$$\sin \gamma = \sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Mamy więc:

$$R = \frac{c}{2 \sin \gamma} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3$$

## Przykład 2

Dany jest trójkąt  $ABC$  taki, że  $AC = 5$ ,  $\angle ABC = 120^\circ$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ .  
Oblicz długość boku  $BC$ .

## Przykład 2

Dany jest trójkąt  $ABC$  taki, że  $AC = 5$ ,  $\angle ABC = 120^\circ$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ .  
Oblicz długość boku  $BC$ .

Wprowadzamy standardowe oznaczenia:  $AC = b$ ,  $\angle ABC = \beta$ ,  $\angle BAC = \alpha$   
oraz  $BC = a$ .

## Przykład 2

Dany jest trójkąt  $ABC$  taki, że  $AC = 5$ ,  $\angle ABC = 120^\circ$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ .  
Oblicz długość boku  $BC$ .

Wprowadzamy standardowe oznaczenia:  $AC = b$ ,  $\angle ABC = \beta$ ,  $\angle BAC = \alpha$   
oraz  $BC = a$ .

Z twierdzenia sinusów mamy:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$



## Przykład 2

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$a = \frac{b \times \sin \alpha}{\sin \beta}$$

## Przykład 2

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$a = \frac{b \times \sin \alpha}{\sin \beta}$$

podstawiając wartości otrzymujemy:

## Przykład 2

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$a = \frac{b \times \sin \alpha}{\sin \beta}$$

podstawiając wartości otrzymujemy:

$$a = \frac{5 \times \sin 45^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{5 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$$

## Przykład 3

Dany jest trójkąt ostrokątny  $ABC$  taki, że  $BC = 7\sqrt{2}$ ,  $AC = 7$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ . Oblicz miarę kąta  $\angle ABC$ .

## Przykład 3

Dany jest trójkąt ostrokątny  $ABC$  taki, że  $BC = 7\sqrt{2}$ ,  $AC = 7$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ . Oblicz miarę kąta  $\angle ABC$ .

Wprowadzamy standardowe oznaczenia:  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $\angle BAC = \alpha$  oraz  $\angle ABC = \beta$ .

## Przykład 3

Dany jest trójkąt ostrokątny  $ABC$  taki, że  $BC = 7\sqrt{2}$ ,  $AC = 7$  oraz  $\angle BAC = 45^\circ$ . Oblicz miarę kąta  $\angle ABC$ .

Wprowadzamy standardowe oznaczenia:  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $\angle BAC = \alpha$  oraz  $\angle ABC = \beta$ .

Z twierdzenia sinusów mamy:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

## Przykład 3

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$\sin \beta = \frac{b \times \sin \alpha}{a}$$

## Przykład 3

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$\sin \beta = \frac{b \times \sin \alpha}{a}$$

podstawiając wartości otrzymujemy:



## Przykład 3

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$\sin \beta = \frac{b \times \sin \alpha}{a}$$

podstawiając wartości otrzymujemy:

$$\sin \beta = \frac{7 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{7\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

## Przykład 3

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

$$\sin \beta = \frac{b \times \sin \alpha}{a}$$

podstawiając wartości otrzymujemy:

$$\sin \beta = \frac{7 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{7\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Ponieważ  $\beta$  jest kątem ostrym i  $\sin \beta = \frac{1}{2}$ , to  $\beta = 30^\circ$ .

Na wejściówce będzie zadania podobne do powyższych.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać na [T.J.Lechowski@gmail.com](mailto:T.J.Lechowski@gmail.com).