

# Największa wartość funkcji w przedziale

Na tej prezentacji omówimy zadania 2.104, 2.105 i 2.106. Rozwiążemy przykłady (b) i (d) z każdego z tych zadań.

Na tej prezentacji omówimy zadania 2.104, 2.105 i 2.106. Rozwińmy przykłady (b) i (d) z każdego z tych zadań. Proszę samodzielnie rozwiązać przykłady (a) i (c).

Na tej prezentacji omówimy zadania 2.104, 2.105 i 2.106. Rozwiążemy przykłady (b) i (d) z każdego z tych zadań. Proszę samodzielnie rozwiązać przykłady (a) i (c). Będzie wejściówka z tego typu przykładów.

Na tej prezentacji omówimy zadania 2.104, 2.105 i 2.106. Rozwiążemy przykłady (b) i (d) z każdego z tych zadań. Proszę samodzielnie rozwiązać przykłady (a) i (c). Będzie wejściówka z tego typu przykładów.

Na lekcji dokończymy zadania z poprzedniego działu (102 i 103) i przejdziemy od razu do badania przebiegu zmienności funkcji.

## 2.104 b

Dana jest funkcja  $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 5$  oraz przedział  $\langle -1, 2 \rangle$

## 2.104 b

Dana jest funkcja  $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 5$  oraz przedział  $\langle -1, 2 \rangle$

Chcemy znaleźć największą i najmniejszą wartość tej funkcji w zadanym przedziale.

## 2.104 b

Dana jest funkcja  $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 5$  oraz przedział  $\langle -1, 2 \rangle$

Chcemy znaleźć największą i najmniejszą wartość tej funkcji w zadanym przedziale. Znajdziemy ekstrema lokalne. W tym celu szukamy punktów krytycznych, czyli punktów, w których pochodna jest 0 lub jest niezdefiniowana. W naszym przykładzie funkcja jest wielomianem, czyli będzie miała pochodną w każdym punkcie.



## 2.104 b

Obliczamy pochodną:

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x$$

i rozwiązujemy  $f'(x) = 0$ :

$$12x^3 - 24x^2 + 12x = 0$$

$$12x(x - 1)^2 = 0$$

## 2.104 b

Obliczamy pochodną:

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x$$

i rozwiązujemy  $f'(x) = 0$ :


$$12x^3 - 24x^2 + 12x = 0$$

$$12x(x - 1)^2 = 0$$

Czyli mamy dwa punkty krytyczne: dla  $x = 0$  oraz dla  $x = 1$ .

## 2.104 b


Szkicujemy wykres pochodnej:



i odczytujemy z niego, że dla  $x = 0$  mamy lokalne minimum, natomiast w  $x = 1$  nie ma ekstremum.

## 2.104 b

Szkicujemy wykres pochodnej:



i odczytujemy z niego, że dla  $x = 0$  mamy lokalne minimum, natomiast w  $x = 1$  nie ma ekstremum.

Tutaj krótkie powtórzenie: w  $x = 0$  jest minimum, gdyż na lewo od 0 pochodna jest ujemna, czyli funkcja maleje, a na prawo od 0 pochodna jest dodatnia, czyli funkcja rośnie. Skoro funkcja najpierw malała, a później zaczęła rosnąć, to musieliśmy mieć lokalne minimum.

## 2.104 b

Obliczamy  $f(0)$ , a także wartości na krańcach przedziału, czyli  $f(-1)$  oraz  $f(2)$ .

## 2.104 b

Obliczamy  $f(0)$ , a także wartości na krańcach przedziału, czyli  $f(-1)$  oraz  $f(2)$ .

Mamy:

$$f(0) = -5$$

$$f(-1) = 12$$

$$f(2) = 3$$

## 2.104 b

Obliczamy  $f(0)$ , a także wartości na krańcach przedziału, czyli  $f(-1)$  oraz  $f(2)$ .

Mamy:

$$f(0) = -5$$

$$f(-1) = 12$$

$$f(2) = 3$$

Czyli najmniejsza wartość funkcji w danym przedziale to  $-5$ , zaś największa to  $12$ .

## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .



## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

Rozwiązujemy równanie:

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 = 0$$

$$x^2(x - 2)^2 = 0$$

## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

Rozwiązujemy równanie:

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 = 0$$

$$x^2(x - 2)^2 = 0$$

Otrzymujemy dwa rozwiązania  $x = 0$  lub  $x = 2$ .

## 2.104 d

Teraz mamy funkcję  $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 1$  oraz przedział  $\langle -1, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

Rozwiązujemy równanie:


$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 = 0$$

$$x^2(x - 2)^2 = 0$$

Otrzymujemy dwa rozwiązania  $x = 0$  lub  $x = 2$ . Mamy dwa punkty krytyczne.


## 2.104 d

Szkicujemy wykres pochodnej:



i odczytujemy z niego, że funkcja nie ma ekstremów.

Szkicujemy wykres pochodnej:



i odczytujemy z niego, że funkcja nie ma ekstremów. Pochodna jest zawsze nieujemna, a więc funkcja będzie zawsze niemalejąca.

## 2.104 d

Nie ma ekstremów, więc obliczamy jedynie wartości na krańcach przedziału



## 2.104 d

Nie ma ekstremów, więc obliczamy jedynie wartości na krańcach przedziału  
Mamy:

$$f(-1) = -3\frac{8}{15}$$

$$f(3) = 2\frac{3}{5}$$

## 2.104 d

Nie ma ekstremów, więc obliczamy jedynie wartości na krańcach przedziału  
Mamy:

$$f(-1) = -3\frac{8}{15}$$

$$f(3) = 2\frac{3}{5}$$

Czyli najmniejsza wartość funkcji w danym przedziale to  $-3\frac{8}{15}$ , zaś największa to  $2\frac{3}{5}$ .

## 2.105 b

$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$  oraz przedział  $\langle -5, 3 \rangle$ .

## 2.105 b

$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$  oraz przedział  $\langle -5, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

## 2.105 b

$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$  oraz przedział  $\langle -5, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji. Pojawiła się pewna komplikacja w postaci przedziału otwartego. Zaraz zobaczymy, jak sobie z tym radzić.

## 2.105 b

$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$  oraz przedział  $\langle -5, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji. Pojawiła się pewna komplikacja w postaci przedziału otwartego. Zaraz zobaczymy, jak sobie z tym radzić. Zaczynamy standardowo:

## 2.105 b

$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$  oraz przedział  $\langle -5, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji. Pojawiła się pewna komplikacja w postaci przedziału otwartego. Zaraz zobaczymy, jak sobie z tym radzić. Zaczynamy standardowo:

$$f'(x) = \frac{-2x(x-3) - (1-x^2)}{(x-3)^2} = \frac{-x^2 + 6x - 1}{(x-3)^2}$$

Teraz rozwiązujemy równanie:

$$\frac{-x^2 + 6x - 1}{(x-3)^2} = 0$$


$$-x^2 + 6x - 1 = 0$$

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

Otrzymujemy rozwiązania  $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$

## 2.105 b

Mianownik pochodnej jest nieujemny, więc szkicujemy licznik:




i odczytujemy z niego, że funkcja ma minimum lokalne dla  $x = 3 - 2\sqrt{2}$  oraz maksimum lokalne dla  $x = 3 + 2\sqrt{2}$ .



## 2.105 b

Mianownik pochodnej jest nieujemny, więc szkicujemy licznik:



i odczytujemy z niego, że funkcja ma minimum lokalne dla  $x = 3 - 2\sqrt{2}$  oraz maksimum lokalne dla  $x = 3 + 2\sqrt{2}$ . Nas interesuje tylko to pierwsze, gdyż rozważany przedział to  $\langle -5, 3 \rangle$ , a  $3 + 2\sqrt{2} \notin \langle -5, 3 \rangle$

## 2.105 b

Obliczymy teraz wartość funkcji w dla  $x = 3 - 2\sqrt{2}$  oraz, co się dzieje na krańcach przedziałów. Z  $-5$  nie ma problemu, po prostu obliczymy wartość funkcji. Ponieważ jednak przedział jest otwarty z prawej strony, to nie będziemy liczyć  $f(3)$ , tylko  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ .

## 2.105 b

Obliczymy teraz wartość funkcji w dla  $x = 3 - 2\sqrt{2}$  oraz, co się dzieje na krańcach przedziałów. Z  $-5$  nie ma problemu, po prostu obliczymy wartość funkcji. Ponieważ jednak przedział jest otwarty z prawej strony, to nie będziemy liczyć  $f(3)$ , tylko  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ .

Mamy:

$$f(3 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 6$$

$$f(-5) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - x^2}{x - 3} = \left[ \frac{-8}{0^-} \right] = \infty$$

## 2.105 b

Obliczymy teraz wartość funkcji w dla  $x = 3 - 2\sqrt{2}$  oraz, co się dzieje na krańcach przedziałów. Z  $-5$  nie ma problemu, po prostu obliczymy wartość funkcji. Ponieważ jednak przedział jest otwarty z prawej strony, to nie będziemy liczyć  $f(3)$ , tylko  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ .

Mamy:

$$f(3 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 6$$

$$f(-5) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - x^2}{x - 3} = \left[ \frac{-8}{0^-} \right] = \infty$$

Czyli najmniejsza wartość funkcji w danym przedziale to  $4\sqrt{2} - 6$ , zaś największa nie istnieje (funkcja dąży do  $\infty$ ).

## 2.105 d

$f(x) = \frac{1}{x^2-4}$  oraz przedział  $\langle 1, 2 \rangle \cup (2, 3 \rangle$ .

## 2.105 d

$f(x) = \frac{1}{x^2-4}$  oraz przedział  $\langle 1, 2 \rangle \cup \langle 2, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

## 2.105 d

$f(x) = \frac{1}{x^2-4}$  oraz przedział  $\langle 1, 2 \rangle \cup (2, 3 \rangle$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = \frac{0 - 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 4)^2}$$


Rozwiązujemy:

$$\begin{aligned}\frac{-2x}{(x^2 - 4)^2} &= 0 \\ -2x &= 0\end{aligned}$$

Otrzymujemy rozwiązanie  $x = 0$ .

## 2.105 d

Mianownik pochodnej jest nieujemny, więc szkicujemy licznik:




Dla  $x = 0$  mamy maksimum, ale  $0 \notin \langle 1, 2 \rangle \cup (2, 3)$ .



## 2.105 d

Mianownik pochodnej jest nieujemny, więc szkicujemy licznik:



Dla  $x = 0$  mamy maksimum, ale  $0 \notin \langle 1, 2 \rangle \cup (2, 3)$ . W danym przedziale nie ma ekstremów.

## 2.105 d

Musimy policzyć co się dzieje na krańcach przedziałów:

## 2.105 d

Musimy policzyć co się dzieje na krańcach przedziałów:

Mamy:

$$f(1) = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} = \infty$$

$$f(3) = \frac{1}{5}$$

## 2.105 d

Musimy policzyć co się dzieje na krańcach przedziałów:

Mamy:

$$f(1) = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} = \infty$$

$$f(3) = \frac{1}{5}$$

Funkcja nie ma ani najmniejszej ani największej wartości.

## 2.106 b

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 4\frac{2}{3}$  oraz przedział  $(-3, 2)$ .

## 2.106 b

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 4\frac{2}{3}$  oraz przedział  $(-3, 2)$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

## 2.106 b

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 4\frac{2}{3}$  oraz przedział  $(-3, 2)$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^2 - x - 6$$

Rozwiązujemy równanie:


$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

Otrzymujemy rozwiązania  $x = 3$  oraz  $x = -2$ .

## 2.106 b

Szkicujemy wykres pochodnej:




Dla  $x = -2$  mamy maksimum, a dla  $x = 3$  minimum.



## 2.106 b

Szkicujemy wykres pochodnej:



Dla  $x = -2$  mamy maksimum, a dla  $x = 3$  minimum. W zadanym przedziale mieści się tylko ten pierwszy argument.

## 2.106 b

Obliczamy wartość dla  $x = -2$  oraz to, co się dzieje na krańcach przedziału:

## 2.106 b

Obliczamy wartość dla  $x = -2$  oraz to, co się dzieje na krańcach przedziału:

Mamy:

$$f(-2) = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} = 9\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -6\frac{2}{3}$$

## 2.106 b

Obliczamy wartość dla  $x = -2$  oraz to, co się dzieje na krańcach przedziału:

Mamy:

$$f(-2) = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} = 9\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -6\frac{2}{3}$$

Funkcja ma największą wartość równą 12, ale nie ma najmniejszej wartości.

## 2.106 b

Obliczamy wartość dla  $x = -2$  oraz to, co się dzieje na krańcach przedziału:

Mamy:

$$f(-2) = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} = 9\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -6\frac{2}{3}$$

Funkcja ma największą wartość równą 12, ale nie ma najmniejszej wartości. Funkcja dąży do  $-6\frac{2}{3}$ , ale nie przyjmuje tej wartości.

## 2.106 b

Obliczamy wartość dla  $x = -2$  oraz to, co się dzieje na krańcach przedziału:

Mamy:

$$f(-2) = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} = 9\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -6\frac{2}{3}$$

Funkcja ma największą wartość równą 12, ale nie ma najmniejszej wartości. Funkcja dąży do  $-6\frac{2}{3}$ , ale nie przyjmuje tej wartości.

W związku z tym zbiorem wartości będzie  $(-6\frac{2}{3}, 12]$

## 2.106 d

$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + 6$  oraz przedział  $(-2, 2)$ .

## 2.106 d

$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + 6$  oraz przedział  $(-2, 2)$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.



## 2.106 d

$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + 6$  oraz przedział  $(-2, 2)$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$$

Rozwiązujemy równanie:

$$x^3 + x^2 - 5x + 3 = 0$$

Jedno rozwiązanie to  $x = 1$ . Dzielimy wielomian i otrzymujemy:

## 2.106 d

$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + 6$  oraz przedział  $(-2, 2)$ .

Szukamy ekstremów tej funkcji.

$$f'(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$$

Rozwiązujemy równanie:

$$x^3 + x^2 - 5x + 3 = 0$$

Jedno rozwiązanie to  $x = 1$ . Dzielimy wielomian i otrzymujemy:


$$(x - 1)(x^2 - 2x - 3) = 0$$

$$(x - 1)^2(x + 3) = 0$$

Czyli mamy rozwiązania  $x = 1$  oraz  $x = -3$ .

## 2.106 d


Szkicujemy wykres pochodnej:



Dla  $x = -3$  mamy minimum, w  $x = 1$  nie ma ekstremum.

## 2.106 d

Szkicujemy wykres pochodnej:



Dla  $x = -3$  mamy minimum, w  $x = 1$  nie ma ekstremum. W związku z tym w danym przedziale nie ma ekstremów.

## 2.106 d

Analizujemy sytuację na krańcach przedziału

## 2.106 d

Analizujemy sytuację na krańcach przedziału  
Mamy:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} = -8\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = 8\frac{2}{3}$$

## 2.106 d

Analizujemy sytuację na krańcach przedziału

Mamy:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} = -8\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} = 8\frac{2}{3}$$

Funkcja nie ma ani najmniejszej ani największej wartości w zadanym przedziale.

## 2.106 d

Analizujemy sytuację na krańcach przedziału

Mamy:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} = -8\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} = 8\frac{2}{3}$$

Funkcja nie ma ani najmniejszej ani największej wartości w zadanym przedziale.

Zbiorem wartości jest przedział otwarty  $(-8\frac{2}{3}, 8\frac{2}{3})$



W poniedziałek będzie z tego wejściówka.